

PROTOCOLE D'UTILISATION

BIOCIDIUM Gel +

TRAITEMENT HYGIENIQUE DES MAINS PAR FRICTION

Avant toute application, il est conseillé d'avoir les mains propres et sèches.

Procéder ensuite à la désinfection des mains jusqu'à séchage complet (**15 secondes minimum**) selon la technique Ayliffe et al ci-après.



Prendre 1,5 mL de **BIOCIDIUM Gel +** avec 1 pression de pompe du flacon de 500 mL



Friction paume contre paume.



Paume de la main droite sur le dos de la main gauche, puis paume de la main gauche sur le dos de la main droite.



Paume contre paume, doigts entrelacés.



Dos des doigts contre la paume opposée avec les doigts emboîtés.



Friction circulaire du pouce droit enchâssé dans la paume gauche, puis friction circulaire du pouce gauche enchâssé dans la paume droite.



Friction en rotation par un mouvement de va-et-vient et les doigts joints de la main droite dans la paume gauche, et inversement.

Renouveler l'opération

pour que le temps de contact total soit de **30 secondes minimum**.

Ne pas rincer, ne pas utiliser de serviette.

Procéder à un lavage à l'eau claire après plusieurs frictions.

Ne pas mélanger à d'autres produits.



F - Facilement inflammable

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.



FRANKLAB

BP 63 - 78185 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX - FRANCE
Tel : +33 1 39 44 93 40 - Fax : +33 1 39 44 93 41
info@franklab.com - www.franklab.com

Protocole

PR 1130

05.2009

7170-1022-5001